

Aciclovir

Crema dérmica 5%

Composición y presentación:

Cada gramo contiene:

Aciclovir 50 mg

Excipientes: Vaselina líquida, alcohol cetosteárico, metilparabeno, propilparabeno, polioxil-20-cetileter, agua purificada, vaselina sólida

Clasificación:

Antiviral.

Indicación:

Tratamiento de infecciones mucocutáneas por Herpes simplex tipo I y II (labial y genital).

Administración (tópico):

Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante se recomienda esquema posológico: La aplicación para el tratamiento de infecciones mucocutáneas de Herpes simplex tipo I y II (labial y genital), es cinco veces al día a intervalos de aproximadamente cuatro horas, omitiendo la aplicación nocturna.

La dosis o cantidad de crema deberá ser indicada por su médico tratante. Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicarlo sobre la zona afectada en cuanto sienta los primeros síntomas de aparición del herpes. No debe ser diluido o ser usado como base para agregar otro medicamento debido a la especialidad de su formulación.

No debe ser aplicado en los ojos.

Uso prolongado

Debe aplicar sobre la zona afectada sólo hasta que la piel recupere su aspecto normal, siguiendo las indicaciones de su médico.

No lo use por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

Precauciones:

Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

Embarazo

Este medicamento puede ser absorbido por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

Lactancia

No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

Lactantes y niños

Aciclovir no debe ser utilizado por niños menores de 2 años. La administración de este medicamento en niños menores de 12 años debe ser bajo indicación y control de su pediatra.

Precauciones especiales

La primera dosis del medicamento, debe aplicarla lo antes posible, en el caso de infecciones recurrentes, es mejor comenzar el tratamiento al primer síntoma o apenas aparezcan las lesiones.

Las mujeres con herpes genital recurrente corren el riesgo de desarrollar cáncer cervical, por lo que debe realizarse un PAP por lo menos una vez al año.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a aciclovir.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Interacciones:

Medicamentos

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento.

Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

Sobredosis:

Si se aplica sobre áreas extensas de la piel, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños, protegido del calor y la humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
No recomiende este medicamento a otra persona.

D-ME-120-30-12193-05