

## **Ambilan® BID 875/125**

### **Comprimidos dispersables**

#### **Composición:**

Cada comprimido dispersable contiene:

Amoxicilina (como trihidrato) 875 mg

Ácido clavulánico (como sal potásica) 125 mg

Excipientes: Aspartamo, dióxido de silicio coloidal, óxido de hierro, talco, aceite de ricino hidrogenado, celulosa microcristalina silicificada, saborizante tropical y saborizante de naranja.

#### **Indicaciones:**

Ambilan BID Comprimidos Dispersables se usa en el tratamiento de infecciones bacterianas, resistentes a amoxicilina sola (productoras de betalactamasas), pero sensibles a esta asociación, del tracto respiratorio (incluyendo oído y nariz), del tracto urinario, de la piel y tejidos blandos, infecciones abdominales y osteomielitis.

#### **Contraindicaciones:**

Este medicamento no debe ser usado, a menos que el médico lo indique expresamente, en pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones:

- **Hipersensibilidad:** Está contraindicada en pacientes que previamente hayan sufrido reacciones alérgicas u otros trastornos graves causados por la Amoxicilina, otras penicilinas o por alguno de los componentes de la fórmula.
- Antecedentes de ictericia colestásica o enfermedad hepática ocasionada por esta asociación o por otras penicilinas.
- Infecciones virales, mononucleosis infecciosa, uricemia linfoidea.
- Personas bajo tratamiento con alopurinol.

#### **Advertencias y precauciones:**

Antes de usar este medicamento se deben sopesar los riesgos y los beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente se deben considerar los aspectos siguientes:

##### **Alergias**

Ud. debe comunicar a su médico si anteriormente ha presentado alguna reacción alérgica a las penicilinas u otros medicamentos o sustancias, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

##### **Embarazo**

Ud. debe informar al médico si está embarazada o planea estarlo.

##### **Lactancia**

Debe consultar con el médico sobre la conveniencia de tomar este medicamento mientras está amamantando. La amoxicilina se elimina en la leche.

##### **Niños**

Los efectos adversos descritos para adultos, pueden presentarse con mayor probabilidad en los niños.

##### **Uso Geriátrico**

En ancianos sanos, sin fallas renales o hepáticas, no es necesario reducir las dosis.

En tratamientos prolongados, su médico puede requerir exámenes de laboratorio para las funciones renal, hepática y hematológica. Pacientes que desarrollen diarrea durante la

terapia con Ambilan BID (amoxicilina y clavulanato de potasio): deben informar inmediatamente a su médico para descartar la presencia de colitis pseudo-membranosa.

### **Presencia de otras enfermedades:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de alguna enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, que pueden llegar a ser severos.

Ud. debe comunicar al médico si padece alguna enfermedad, o si la ha padecido anteriormente, como ser:

- Alergia a las penicilinas.
- Enfermedad del hígado o de los riñones.

### **Interacciones con otros fármacos:**

El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros (Interacciones). Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta.

Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos:

- **Alopurinol:** Elevada incidencia de manchas rojas en la piel (rash) cuando se usa conjuntamente con penicilinas. Se debería evitar el uso conjunto de ellos.
- **Anticonceptivos orales:** Pueden perder eficacia, debido a las penicilinas.

### **Efectos Adversos:**

Los medicamentos pueden provocar algunos efectos no deseados, además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos, aunque raramente se presentan, pueden requerir atención médica.

Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes:

Náuseas, vómitos, diarrea (que sobreviene más frecuentemente en niños).

Manifestaciones alérgicas: especialmente urticaria, inflamación de boca y cara, dificultad respiratoria, excepcionalmente shock anafiláctico. Erupciones cutáneas.

Otras manifestaciones referidas más raramente son casos de hepatitis, ictericia (piel y ojos amarillos, orina oscura, dolor abdominal).

Excepcionalmente, algunos casos de erupción cutánea extensa con fiebre y otros síntomas graves, inflamación con desprendimiento de la piel. Colitis intensa, alteraciones sanguíneas (irritación de garganta, voz ronca, fiebre, cansancio). Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante, si continúan o se intensifican, debe comunicarlo al médico.

Deposiciones blandas, dispepsia y dolores de estómago. Infección por cándida (moniliasis).

### **Forma de Administración y Dosis:**

Administrar por vía oral, con o sin los alimentos. Los comprimidos deben ser colocados en un vaso con agua y desintegrados con la ayuda de una cucharita, hasta su completa dispersión.

Tome este medicamento sólo en la forma indicada por el médico; no lo tome en mayor cantidad ni con mayor frecuencia o por mayor tiempo que el ordenado por el médico.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es: Adultos y niños mayores de 12 años:

- **Infecciones severas:** Un comprimido dispersable de Ambilan BID (Amoxicilina 875 mg y Ácido Clavulánico 125 mg) cada 12 horas.

Los tratamientos no deben durar más de 14 días.

**Sobredosis:**

Los síntomas de intoxicación no se han descrito. En caso de sospecha de sobredosis con aparición de síntomas, trasladar al enfermo al establecimiento de salud más próximo para el tratamiento de los síntomas. Lleve este medicamento y otros que pudiesen haber estado al alcance del intoxicado.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.