

Bacitracina + Neomicina

Ungüento dérmico

Composición y presentación:

Cada gramo contiene:

Neomicina (como sulfato) 5,00 mg

Bacitracina 500 U.I.

Excipientes: Vaselina líquida, Vaselina sólida.

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de corto plazo de infecciones cutáneas en heridas leves causadas por gérmenes sensibles.

Clasificación:

Antibiótico tópico.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 6 años sin indicación médica.

Contraindicaciones:

No aplicar en infecciones mamarias durante la lactancia, ni en caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Interacciones:

No se han descrito interacciones al aplicar tópicamente sobre la piel o mucosas.

Efectos indeseables y reacciones adversas:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: reacciones de hipersensibilidad como picazón, enrojecimiento, hinchazón u otro signo de irritación que no estuviera presente antes de usar este producto.

Precauciones:

No usar sobre lesiones exudativas o superficies extensas por períodos prolongados, sin autorización médica.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es: Aplicación tópica dérmica cada 8 horas.

Modo de empleo:

Administrar solamente por vía tópica-dérmica. Aplicar una pequeña cantidad de Bacitracina+Neomicina ungüento en la zona afectada. Evitar el contacto con los ojos o sus alrededores.

Sobredosis:

Dada la forma de administración tópica-dérmica, no se han reportado efectos tóxicos.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, protegido del calor. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.