

**Burten®**  
**Comprimidos 10 mg**  
**Ketorolaco trometamol**

**Composición y presentación:**

Cada comprimido contiene:

Ketorolaco Trometamol 10 mg

Excipientes: Esencia de menta polvo tipo B, sacarina sódica dihidrato, estearato de magnesio vegetal, lactosa monohidrato de compresión directa, manitol, sorbitol, crospovidona, dióxido de silicio.

**Clasificación:**

Analgésico. Antiinflamatorio.

**Indicaciones:**

Analgésico para uso por períodos cortos de tiempo.

**Usos:**

Alivio sintomático del dolor moderado a severo, tales como post-parto, post-operatorio, ortopedia, dolor ciático y para el dolor visceral asociado con cáncer.

**Precauciones y advertencias:**

No se recomienda su uso en niños. Los pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico, pueden ser sensibles a otros antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios pueden producir irritación o ulceración de la mucosa gástrica. En pacientes geriátricos o con alteración de la función renal, hepática o cardíaca se deben reducir las dosis para prevenir efectos adversos. Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. No usar por más de 5 días por vía inyectable ni por más de 14 días por vía oral. No se recomienda su uso en niños.

Usted debe consultar a su médico antes de usar un analgésico-antiinflamatorio (AINEs) (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca). Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento, gastrointestinal o úlceras estomacales.

**Contraindicaciones:**

No usar en caso de haber presentado anteriormente reacción alérgica (hipersensibilidad) al Ácido Acetilsalicílico, Ketorolaco, a otros analgésicos-antiinflamatorios o a cualquiera de los excipientes de la fórmula. No administrar en pacientes ulcerosos, con insuficiencia renal o hepáticas graves.

- **Embarazo:** No usar en la última etapa del embarazo. Aunque no hay informes sobre daño fetal, su uso sólo debe hacerse con indicación y bajo supervisión médica. No se recomienda el uso en niños.

No se debe usar analgésicos-antiinflamatorios (AINEs) con excepción de Ácido Acetilsalicílico, en el período inmediato a una cirugía de bypass coronario.

**Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Sales de Litio. Diuréticos (Furosemida, Tiazidas, Espironolactona, Triamterena). Antihipertensivos y Corticoides en general. Antidiabéticos, Anticoagulantes. Acido acetilsalicílico, otros Analgésicos-Antiinflamatorios. No se aconseja la asociación con estos medicamentos.

**Reacciones adversas:**

Los medicamentos pueden provocar algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Suspenda el medicamento y consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes:

Reacciones de hipersensibilidad o alergia (edema o hinchazón de cara y piernas, erupción cutánea, picazón, crisis de asma), vómito o deposiciones sanguinolentas o negras como alquitrán, dolor de estómago, perturbaciones del tránsito intestinal. Labios y uñas color azulado. Coloración amarilla de ojos y piel, orina café.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (Adaptación del organismo al medicamento). No obstante, si continúan o se intensifican, debe comunicarlo al médico.

Malestar estomacal, acidez, sensación de plenitud, náuseas, vómitos, somnolencia, alteraciones digestivas.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:

- **Vía oral:** Un comprimido dos o tres veces en el día.

**Modo de empleo:**

Los comprimidos preferentemente se deben tomar después de las comidas o bien con alimentos o antiácidos para reducir la irritación gastrointestinal. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

**Sobredosis:**

En caso de sospecha de sobredosis o aparición de síntomas (letargo, somnolencia, hemorragia digestiva, convulsiones) trasladar al paciente a un centro asistencial para el control de los síntomas y medidas de apoyo necesarias.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original; en lugar seco, a menos de 30°C, protegido de la luz y fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este tratamiento a otra persona.