

Codetol® pm Adulto Jarabe

Composición y presentación:

Cada 5 mL de jarabe Codetol pm Adulto contiene:

Codeína fosfato (como Hemihidrato), Pseudoefedrina clorhidrato, Clorfenamina maleato.
Excipientes: Extracto fluido de Palto, Extracto fluido de Eucaliptus, Glicerol, propilenglicol, metilparabeno, sacarina sódica dihidrato, esencia de miel, esencia de menta piperita, esencia de anís, alcohol, sorbitol. No contiene azúcar.

Indicaciones:

Indicado en el tratamiento sintomático de la tos, con congestión nasal asociada, debida a resfríos y a infecciones menores de las vías respiratorias.

Clasificación:

Antitusivo. Descongestionante Antihistamínico.

Precauciones y advertencias:

Mientras esté tomando este medicamento debe tener presente que pacientes con asma o enfermedad respiratoria, puede producir depresión respiratoria y empeorar su condición. No se debe ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

Este medicamento puede ser usado, sólo si es realmente necesario en pacientes con: presión intraocular alta, obstrucción intestinal, inflamación de la próstata, obstrucción del cuello de la vejiga, diabetes mellitus.

Puede inducir sueño; tener presente las personas que conducen vehículos o deben operar maquinarias que requieren atención permanente.

Sujeto a control de estupefacientes. Puede causar dependencia. Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Luego de una administración prolongada con dosis elevadas de Codeína, puede ocurrir tolerancia y dependencia física. Consulte con el médico si se siente fatigado, con malestar general o tiene que aumentar las dosis para el control de sus síntomas.

Embarazo y Lactancia: La codeína puede inducir síntomas de privación y depresión respiratoria en el neonato; aparece en la leche al igual que la pseudoefedrina en concentraciones variables; no se aconseja tomarlo durante la lactancia.

Contraindicaciones:

En pacientes hipersensibles que hayan desarrollado reacciones alérgicas a la codeína, clorfenamina, pseudoefedrina u otros antigripales descongestionantes.

En pacientes con hipertensión severa o con enfermedades coronarias graves, y aquellos que reciben inhibidores de la monoaminoxidasa.

Personas asmáticas, o con enfermedad hepática grave. No usar en recién nacidos. No administrar a niños menores de 2 años.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Alcohol, Benzodiazepinas, Neostigmina, Antidepresivos, Diuréticos,

Antihipertensivos (Propranolol, Atenolol), Dopamina, Adrenalina o Noradrenalina, Moclobemida, Selegilina, Isocarboxazida, Furazolidona.

Efectos adversos:

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos que normalmente no requieren atención médica: Sedación, somnolencia, mareos, visión borrosa, sequedad de mucosas (boca, garganta y nariz), náuseas, vómitos, estreñimiento.

Si se presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, suspenda el medicamento y consulte a su médico: Alzas bruscas de la presión arterial, aceleración de los latidos, pérdida de la conciencia, reacciones alérgicas graves.

Modo de empleo y dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular; no obstante, la dosis usual recomendada es:

- **Adultos y mayores de 12 años:** 5 a 10ml (una o dos cucharaditas) cada 4-6 horas. No sobrepasar los 40ml por día.

- **Niños de 6 a 12 años:** 5ml (una cucharadita) cada 4-6 horas. No sobrepasar los 20ml por día.

Administrar por vía oral, usando una medida o una cucharita de té; el jarabe se puede tomar con algún alimento en caso de presentar molestias gástricas.

Sobredosis:

Si se sospecha de sobredosis por la aparición de síntomas (náuseas, vómitos, somnolencia, inconciencia) trasladar al enfermo a un centro asistencial, para el tratamiento de los síntomas y medidas de mantención que correspondan.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor a no más de 30°C. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación medica.

No recomiende este medicamento a otra persona.