

## **Contralmor® Supositorios**

### **Composición y presentación:**

Cada supositorio contiene: Betametasona (como dipropionato) 1,00 mg, Lidocaína 20,00 mg, Óxido de zinc 250,00 mg  
Excipientes: Masa para supositorios.

### **Clasificación:**

Antihemorroidal.

### **Indicaciones:**

Tratamiento sintomático de las hemorroides, y de las manifestaciones dolorosas y pruriginosas anales. La crisis hemorroidal se presenta especialmente durante el embarazo y el post-parto. Tratamiento paliativo de la fisura anal.

### **Advertencias:**

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Este producto contiene corticosteroide y puede producirse absorción. Los tratamientos deben ser de corta duración; si no hay mejoría, se debe practicar un examen proctológico cuidadoso. No usar por períodos prolongados, ni en dosis altas sin indicación del médico.

### **Contraindicaciones:**

No usar en caso de: Tuberculosis local, infecciones virales, sífilis o sensibilidad a algún componente de la fórmula.

### **Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Los corticosteroides pueden interactuar con los anticoagulantes, antidiabéticos, barbitúricos, antihipertensivos, vacunas a virus vivos.  
- **Nota:** las cantidades de lidocaína absorbidas no ejercen ningún efecto central o cardíaco importante.

### **Efectos indeseables:**

En general, este producto es bien tolerado, el uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Reacciones cutáneas, generalmente benignas y transitorias (prurito, irritación, sequedad). Trastornos digestivos: con los supositorios, se ha observado muy ocasionalmente un aumento de la motilidad intestinal.

### **Precauciones:**

No se debe administrar en forma indiscriminada por el riesgo que conlleva el uso de corticosteroides (vasoconstricción, baja de defensas inmunológicas), lo que podría conducir a una ulceración del sitio afectado con pérdida de la irrigación sanguínea y agravamiento de la enfermedad.  
- **Embarazo:** No debería usarse en grandes cantidades o por períodos prolongados en pacientes embarazadas o que planean estarlo.

- **Lactancia:** Se desconoce si los corticoides rectales se distribuyen en la leche materna. No se recomienda su uso en madres que amamantan.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 1 a 2 supositorios al día, por 2 a 6 días.

**Modo de empleo:**

Los supositorios se administran por vía rectal. Administrar los supositorios por la mañana y por la noche.

**Sobredosis:**

No se han reportado casos de sobredosis con estas formas de administración.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor y humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.