

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE.
AMBILAN BID FORTE 800/57 POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL CON
SOLVENTE

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición y Presentación:

AMBILAN BID FORTE POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL CON SOLVENTE

Cada 5 ml suspensión reconstituida, contiene:

Amoxicilina	800 mg
Ácido Clavulánico	57 mg
Frasco con polvo para preparar	90 mL
Frasco con solvente para preparar	90 mL

Excipientes: Ácido cítrico anhidro, Celulosa Microcristalina, Citrato de Sodio Dihidrato, Dióxido de Silicio, Dióxido de Silicio Coloidal, Goma Xantano, Manitol, Sabor Limón Polvo, Sacarina Sódica, Sorbato de Potasio, Metilparabeno, Agua purificada.

Indicaciones:

Tratamiento de infecciones bacterianas (incluyendo oído y nariz), del tracto urinario, de la piel y tejidos blandos, sepsis intra-abdominal y osteomielitis causados por microorganismos sensibles a la asociación, demostrado por antibiograma.

Clasificación:

Antibiótico.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Los derivados penicilínicos pueden provocar reacciones anafilácticas (shock) graves en personas sensibilizadas. Cumplir con el ciclo completo del tratamiento.

La administración de este medicamento a los niños debe hacerla un adulto responsable.

Contraindicaciones:

No usar en caso de haber sufrido reacciones alérgicas a consecuencia de tomar alguna penicilina, cefalosporina o sus derivados. Personas que padezcan o con antecedentes de haber padecido de ictericia o enfermedad hepática grave. Infecciones por gérmenes o bacterias no sensibles al antibiótico.

Interacciones:

Se han descrito interacciones con los siguientes productos:
Alopurinol: Aumenta el riesgo de producir erupción cutánea.
Anticonceptivos orales: Se reduce la eficacia anticonceptiva.
Metorexato: Aumentan efectos secundarios hematológicos.

Reacciones adversas o efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos indeseables, que normalmente no requieren atención médica, a menos que persistan o empeoren: prurito, náuseas, vómitos, diarrea pasajera, dolor de cabeza, mareos, modificación de la flora intestinal.

Si se presentan otras reacciones adversas de tipo alérgico o de hipersensibilidad, (grave) suspenda el medicamento y acuda a su médico. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser: inmediatas (entre 2 a 30 minutos): urticaria, rubor, prurito difuso, hipotensión arterial y edema laríngeo. Tardías, después de unas horas o días: picazón, reacción de inflamación erupciones cutáneas, urticaria, dolor de articulaciones, y menos frecuente, fiebre. Otras reacciones: hepatitis, ictericia, daño renal, diarrea violenta, candidiasis vaginal, dermatitis grave.

Precauciones:

Si se produce algún tipo de reacción alérgica, su uso debe ser discontinuado de inmediato y si empeora, acudir rápidamente a un establecimiento de urgencia.

|

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular; no obstante, la dosis usual recomendada para niños mayores de 12 años y adultos es 5 ml (800 mg de amoxicilina) cada 12 horas.

La dosis usual recomendada para niños es de 25 a 75 mg por Kg de peso en 24 hrs.

Modo de empleo:

La suspensión de Ambilan BID Forte, previamente preparada de acuerdo a las instrucciones, puede tomarse tal cual o bien mezclada con agua, leche, jugos de fruta, o bien, con los alimentos.

Las suspensiones reconstituidas mantienen su potencia durante 7 días si se refrigeran. Agitar bien antes de usar.

Instrucciones:

Invierta dos o tres veces el frasco cerrado con polvo para soltar su contenido. Destape los dos frascos y coloque lentamente el contenido del solvente en el frasco que contiene el polvo. Cierre el frasco con la tapa y agite fuertemente hasta que todo el contenido se haya disuelto.

Sobredosis:

Debido a que no existe un antídoto específico, el tratamiento de la sobredosis debe ser sintomático y de mantenimiento y debe realizarse en un establecimiento

asistencial. Las reacciones de hipersensibilidad (shock) pueden llegar a ser graves por lo que deben tratarse urgentemente; en caso de shock, el enfermo se debe tratar con oxígeno, corticosteroides inyectables y vasopresores, con una adecuada hidratación intravenosa.

Condiciones de Almacenamiento:

Después de la reconstitución en el solvente, el plazo de vida útil del producto es de 7 días, conservado en su envase original en refrigeración (2° y 8°C). Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

LABORATORIO CHILE S.A.
Santiago – Chile
www.laboratoriochile.cl