

## **Ginedazol Dual®**

### **Crema y óvulos vaginales**

#### **Composiciones y presentaciones:**

##### **Cada óvulo contiene:**

Tinidazol 150 mg  
Miconazol (como nitrato) 100 mg  
Excipientes: masa para óvulos.

##### **Cada 100 g de crema contiene:**

Tinidazol 3 g  
Miconazol (como nitrato) 2 g  
Excipientes: Metilparabeno, propilparabeno, monocetileter de polietilenglicol, alcohol cetoestearílico, vaselina sólida, vaselina líquida, agua purificada.

#### **Clasificación:**

Antifúngico.

#### **Indicaciones:**

Esta asociación de medicamentos está indicada en el tratamiento de vulvovaginitis micóticas, tricomoniasis o mixtas.

#### **Administración (tópica):**

##### **Rango y frecuencia**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de: 1 óvulo vaginal antes de acostarse por un período de 10 a 14 días.

Introducir profundamente en la vagina todas las noches. La crema se aplica en la mucosa externa y la vulva. Es recomendable que el tratamiento involucre a la pareja; para el hombre, aplicar la crema en el glande y surco prepucial. Cumplir con el ciclo completo del tratamiento indicado por su médico. Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

##### **Consejo de cómo administrarlo**

Lave la zona afectada antes de administrar el medicamento, para eliminar escamas y restos del último tratamiento. Se recomienda aplicar el medicamento durante la noche. Es recomendable que utilice ropa interior de algodón y que la cambie todos los días. No se recomienda el uso de protectores diarios, ya que estos pueden aumentar la humedad en la zona.

##### **Uso prolongado**

Use este medicamento por el tiempo señalado por su médico, aunque sus síntomas hayan desaparecido.

#### **Precauciones:**

##### **Mayores de 60 años**

No existen recomendaciones especiales para los ancianos.

**Consumo de alcohol**

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento y hasta 3 días después de haber terminado el tratamiento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos severos.

**Manejo de vehículos**

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

**Embarazo**

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

**Lactancia**

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

**Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

**Precauciones especiales**

Para conseguir una curación completa de la infección es muy importante que complete el tratamiento descrito por su médico, en términos de frecuencia y días de utilización, aunque los síntomas hayan desaparecido antes.

Es aconsejable que el tratamiento también se aplique a su pareja sexual.

Debe evitar el contacto de la crema con los ojos.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

**Contraindicaciones:**

Si ha presentado síntomas de alergia a tinidazol, miconazol u otro antifúngico azólico. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

**Interacciones:****Medicamentos**

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

**Efectos adversos:**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: quemazón, rash, irritación, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

**- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

**Sobredosis:**

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos.

Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.