

Ginedazol®

Óvulos

Composición y presentación:

Cada óvulo contiene:

Tinidazol 150 mg

Miconazol (como nitrato) 100 mg

Excipientes: Masa para óvulos.

Clasificación:

Antifúngico.

Indicación:

Esta asociación de medicamentos está indicada en el tratamiento de vulvovaginitis micóticas, tricomoniasis o mixtas.

Administración (tópica):

Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 1 óvulo vaginal antes de acostarse por un período de 14 días.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Consejo de cómo administrarlo

Lave la zona afectada antes de administrar el medicamento, para eliminar escamas y restos del último tratamiento. Se recomienda aplicar el medicamento durante la noche.

Es recomendable que utilice ropa interior de algodón y que la cambie todos los días.

No se recomienda el uso de protectores diarios, ya que estos pueden aumentar la humedad en la zona.

Uso prolongado

Use este medicamento por el tiempo señalado por su médico, aunque sus síntomas hayan desaparecido.

Precauciones:

Mayores de 60 años

No existen recomendaciones especiales para las ancianas.

Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento y hasta 3 días después de haber terminado el tratamiento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos severos.

Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

Embarazo

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niñas debe ser previa consulta a su pediatra.

Precauciones especiales

Para conseguir una curación completa de la infección es muy importante que complete el tratamiento descrito por su médico, en términos de frecuencia y días de utilización, aunque los síntomas hayan desaparecido antes. Es aconsejable que el tratamiento también se aplique a su pareja sexual. Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a tinidazol, miconazol u otro antifúngico azólico.
Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Interacciones:**Medicamentos**

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros.

Efectos adversos:

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: quemazón, rash, irritación, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

Sobredosis:

No se han reportado casos de sobredosis con esta forma de administración.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.