

**Grifoclobam®**  
**Comprimidos 10 mg**  
**Clobazam**

**Composición y presentación:**

Cada comprimido contiene:

Clobazam 10 mg

Excipientes: Sodio lauril sulfato, talco, magnesio estearato, lactosa monohidrato, sodio almidón glicolato.

**Clasificación:**

Ansiolítico.

**Indicaciones:**

Ansiolítico. Adyuvante en el tratamiento de la epilepsia.

**Advertencias:**

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Puede producir somnolencia. Puede inducir dependencia.

**Contraindicaciones:**

No usar en caso de hipersensibilidad a la droga. Depresión no tratada. Glaucoma agudo de ángulo cerrado. Miastenia gravis. Personas bajo tratamiento con antidepresivos [I-MAO]. No administrar en mujeres embarazadas y durante el período de lactancia.

**Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Antidepresivos, Antiácidos, Antihipertensivos en general, Alcohol, Antihistamínicos, Antipsicóticos, Disulfiramo, Cimetidina, Levodopa, IMAO. No se recomienda su asociación con estos productos, salvo indicación del médico.

**Efectos indeseables:**

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica a menos que sean muy molestos: torpeza e inestabilidad, especialmente en pacientes geriátricos o debilitados: mareos, aturdimiento, somnolencia residual durante el día cuando se utiliza como hipnótico, hablar confuso, malestar estomacal, náuseas, vómito, visión borrosa. Amnesia.

**Reacciones adversas:**

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, acuda a su médico: Confusión y depresión mental; reacción alérgica (rash cutáneo); problemas de comportamiento incluyendo escalofríos, fiebre, dolor de garganta. Necesidad de incrementar la dosis.

**Precauciones:**

Evitar su uso en el embarazo y durante el período de lactancia. Reducir las dosis en pacientes ancianos o debilitados o en personas que padecen de insuficiencia renal, hepática o respiratoria.

Este producto contiene lactosa monohidrato, precaución en pacientes diabéticos.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Adultos:** 10 a 60 mg/día.

- **Niños mayores de 3 años:** Mitad de la dosis para adultos. Oral c/8 – 24 horas.

**Modo de empleo:**

Administrar por vía oral con un vaso de líquido o con alimentos. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

**Sobredosis:**

**Síntomas de sobredosis son:** Confusión continua; reflejos disminuidos, somnolencia intensa; temblores, latidos cardíacos lentos, sensación de falta de aire o respiración dificultosa. En caso de aparición de síntomas de sobredosis, trasladar al paciente a un centro asistencial para su tratamiento. Llevar este folleto informativo al centro asistencial.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original, protegido del calor, y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.