

## **Ibuprofeno**

### **Comprimidos 400mg**

#### **Composición y presentación:**

Cada comprimido contiene:

Ibuprofeno 400 mg

Excipientes: Almidón de maíz, almidón pregelatinizado, sodio almidón glicolato, ácido esteárico, dióxido de silicio coloidal, povidona.

#### **Indicaciones:**

- Tratamiento sintomático de estados inflamatorios dolorosos, de leves a moderados y/o estados febriles.
- Tratamiento de la dismenorrea.
- Alivio de síntomas y signos de artritis reumatoidea y osteoartritis.

#### **Advertencias y precauciones:**

Usted debe consultar a su médico antes de usar este medicamento antiinflamatorio AINE (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca).

Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento, gastrointestinal o úlceras estomacales.

Úsese sólo por indicación médica, especialmente en ancianos y niños. El consumo de alcohol durante el tratamiento puede exacerbar las reacciones adversas.

Si Ud. padece hemofilia, hipertensión, falla cardíaca, diabetes, adicción al tabaco o alcohol, hágalo saber al médico antes de tomar este medicamento.

Los pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico, pueden serlo también a otros antiinflamatorios como el ibuprofeno.

Los antiinflamatorios pueden producir irritación o ulceración de la mucosa gástrica o intestinal. En pacientes ancianos o con falla renal, o hepática, puede ser necesario reducir la dosis para prevenir la acumulación del antiinflamatorio y la retención de líquido. Personas con defectos de la coagulación sanguínea deben controlarse frecuentemente.

No tomar junto con otros antiinflamatorios AINES, por posible aumento de los efectos adversos.

Controles especiales: En tratamientos a largo plazo el médico puede recomendar efectuar exámenes de sangre, pruebas de hemorragia oculta en heces, funcionamiento renal, análisis de orina y recuentos sanguíneos.

Antes de usar este medicamento se deben sopesar los riesgos y los beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente se deben considerar los aspectos siguientes:

- **Presencia de otras enfermedades:** Ud. debe comunicar a su médico si anteriormente ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento, al ácido acetyl salicílico o a otras sustancias, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.
  - **Niños:** Los efectos adversos descritos para adultos, pueden presentarse con mayor probabilidad en los niños.
- No se recomienda el uso de este medicamento en niños menores de 14 años (Ibuprofeno 600 mg) y en niños con menos de 40 Kg de peso (Ibuprofeno 400 mg).
- **Uso geriátrico:** En ancianos sanos, sin fallas renales o hepáticas, no es necesario reducir las dosis.

#### **Contraindicaciones:**

- No se debe usar analgésicos antiinflamatorios AINES con excepción de Ácido Acetilsalicílico, en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.
- No usar en caso de presentar hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno y/o a otros antiinflamatorios no esteroideos. No administrar en pacientes ulcerosos, con insuficiencia renal o cardíaca graves, ni en los que padecen porfiria.

- **Embarazo y Lactancia:** No usar durante el embarazo ni mientras esté amamantando.

### **Interacciones con otros fármacos:**

El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros dando origen a interacciones. Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos:

- **Sales de Litio, Diuréticos (Furosemida, Tiazidas) o Diuréticos ahorradores de potasio (Espironolactona, Triamterena):** Pueden deteriorar la función del riñón o producir elevación del potasio sanguíneo.

- **Antihipertensivos, Corticoides, Antidiabéticos o Anticoagulantes:** No se aconseja su asociación con estos medicamentos sin control directo del médico.

### **Efectos adversos:**

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, deje de tomarlo y consulte inmediatamente a su médico: reacciones de hipersensibilidad (edema, erupción cutánea, picazón, inflamación de boca, lengua y garganta, crisis de asma), dolor de estómago intenso, vómito o deposiciones sanguinolentas o de aspecto negro alquitranado. Hinchazón y falla renal.

El uso de este medicamento puede producir otros efectos que usualmente no requieren atención médica, a menos que persistan o se hagan intolerables: Malestares estomacales, acidez, náuseas, vómitos. Rinitis, congestión nasal.

### **Forma de administración y dosis:**

Administrar por vía oral, con los alimentos, o un vaso de leche, o bien, junto con antiácidos, para prevenir la irritación estomacal.

Tome este medicamento sólo en la forma indicada por el médico; no lo tome en mayor cantidad ni con mayor frecuencia o por mayor tiempo que el ordenado por el médico.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:

- **Adultos:** La dosis usual de Ibuprofeno en el tratamiento sintomático de artritis reumatoidea crónica y aguda y en osteoartritis es 400 - 800 mg 3 o 4 veces al día. La dosis debe ser ajustada de acuerdo a la respuesta y tolerancia del paciente. No exceder de los 2,4 g diarios.

Para el alivio del dolor leve a moderado y cuadros febriles, la dosis usual en adultos es de 400 mg cada 4 a 6 horas. También se usa en dismenorrea primaria con dosis de 400 mg cada 4 horas, para lo cual el tratamiento debe iniciarse con los primeros síntomas de dolor, sin exceder los 1,2 g.

- **Niños:** No se recomienda el uso de Ibuprofeno 400 mg en niños con menos de 40 Kg de peso, e Ibuprofeno 600 mg en niños menores de 14 años, ya que la dosis de Ibuprofeno que contienen no es adecuada para la posología recomendada en estos niños.

Artritis reumatoidea juvenil: se pueden dar 40 mg/kg de peso corporal por día en dosis divididas. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

### **Sobredosis:**

En caso de sospecha de sobredosis con aparición de síntomas de intoxicación, (letargo, somnolencia, convulsiones, hemorragia digestiva) trasladar al enfermo al establecimiento asistencial de urgencia. Lleve este medicamento y otros que pudiesen haber estado al alcance del enfermo.

### **Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; en lugar seco a temperatura menor a 30°C. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.