

Ketoconazol

Crema tópica 2%

Composición y presentación:

Cada gramo de crema contiene:

Ketoconazol 20 mg

Excipientes: Agua purificada, alcohol cetosteárico, polioxil-20-cetileter, vaselina sólida, vaselina líquida, sodio sulfito, propilenglicol.

Clasificación:

Antimicótico de uso tópico.

Indicaciones:

Infecciones de la piel por hongos, (micosis de la piel), dermatitis seborreica, candidiasis, tiñas diversas (pie de atleta, tiña de la piel).

Advertencias y precauciones:

Úsese sólo por indicación médica. Se puede producir sensibilización cutánea y alergia. La mejoría de los síntomas, con alivio del prurito, suele producirse en la primera semana del tratamiento.

Infecciones muy extensas, pueden requerir de un tratamiento con un antimicótico por vía oral.

Para asegurar el diagnóstico, en caso de dudas, puede ser necesario el examen de una muestra de tejidos afectados.

Evitar el contacto de la crema con los ojos y sus alrededores. Consultar al médico si no se produce alivio en 1 semana. No usar antes de dos semanas de terminado un tratamiento tópico con corticoides en casos de dermatitis seborreica.

- **Embarazo y lactancia:** A pesar que su absorción es muy baja, se debe usar solamente si el médico lo autoriza.

Contraindicaciones:

No usar en caso de haber provocado alergia anteriormente (hipersensibilidad) al Ketoconazol u otros antimicóticos relacionados.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. No se han descrito interacciones de importancia por esta vía.

Efectos adversos:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: enrojecimiento, urticaria o picazón, escozor, inflamación u otros signos de irritación cutánea. Consultar al médico si las molestias no cesan o se intensifican.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular; no obstante, la dosis usual recomendada es: Una o dos aplicaciones al día.

Modo de empleo:

Aplicar una fina capa de crema sobre el área de la piel afectada y su alrededor; frotar con suavidad hasta absorción total. Aplicar de preferencia por la noche al acostarse. Continuar el tratamiento luego de desaparecidos los síntomas. La duración del tratamiento debe ser de dos semanas como mínimo. Cuando la infección compromete la planta del pie, el tratamiento puede prolongarse de 4 a 6 semanas.

Sobredosis:

Dada la vía de administración (crema), no se han reportado casos de sobredosis.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este tratamiento a otra persona.

E12277-02