



INSUMO : Instructivo Freshmel Miel Limón - Menta fresca
DIMENSIONES : 168 x 130 mm
COLOR PANTONE : Negro
MATERIAL : Papel Bond 22 56 g/m²
CODIGO E : D-ME-120-30-15888-01
VERSION : 12 / MAY / 2022
ELABORADO POR : Franco Saavedra R.
ESCALA : 1 : 1

EMPAQUE EXTERIOR: Cajas de cartón corrugado debidamente rotuladas y selladas



FRESHMEL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE FRESHMEL MIEL LIMÓN COMPRIMIDOS 5 MG FRESHMEL MENTA FRESCA COMPRIMIDOS 5 MG

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico.

INDICACIONES:

Este producto está recomendado junto al medicamento indicado por su médico, en el alivio de las molestias de la garganta producidas por infecciones bucofaringeas (Faringitis, amigdalitis).

CLASIFICACIÓN:

Antiséptico Bucofaríngeo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Disolver en la boca un comprimido cada 3 ó 4 horas.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Freshmel Miel Limón comprimidos 5 mg

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene:
 Clorhexidina diclorhidrato 5 mg
 Excipientes: aspartamo, esencia de miel polvo, esencia de limón polvo, esencia de propóleo, colorante FD&C amarillo N°5 lacado, estearato de magnesio, sorbitol.

Freshmel Menta Fresca comprimidos 5 mg

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene:
 Clorhexidina diclorhidrato 5 mg
 Excipientes: aspartamo, esencia de menta polvo, mentol, colorante FD&C azul N° 1 lacado, colorante FD&C amarillo N° 5 lacado, estearato de magnesio, sorbitol.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Las amigdalitis y otras infecciones pueden causar graves problemas a largo y mediano plazo si no son tratadas con los medicamentos adecuados y a través de un diagnóstico médico. Este medicamento puede aliviar el dolor de garganta y otros problemas asociados a este tipo de enfermedades, pero no cura ni previene las complicaciones mencionadas.

- No usar si usted ha experimentado alergias a desinfectantes cutáneos, enjuagatorios bucales u otros antisépticos bucofaringeos de otra marca.
- Embarazo: No usar salvo indicación médica.
- Lactancia: No usar salvo indicación médica.
- Niños: No usar en menores de 12 años sin indicación médica.

- Ancianos: Usted debe informar a su médico o químico farmacéutico respecto de las enfermedades que tiene o los medicamentos que usa antes de hacer uso de este medicamento en personas de tercera edad.
- Otras: acuda a su médico o químico farmacéutico ante cualquier duda respecto a la administración, efectos, riesgos o cualquier otro aspecto que usted considere importante aclarar o mencionar antes del uso del medicamento.

INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros (interacción).
 Es muy importante que consulte con el médico o químico farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento si está tomando otros.

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:

El efecto de un medicamento puede ser modificado por la presencia de una enfermedad, dando a lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. Debe hacer mención de ella al médico o químico farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes:
 Problemas respiratorios, cardíacos o digestivos.

EFFECTOS ADVERSIS (NO DESEADOS):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toman por un período prolongado de tiempo y/o en grandes dosis. Si aparece cualquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al médico: Mareos, náuseas o vómitos / Problemas respiratorios.
 Otros efectos indeseables sólo son pasajeros y normalmente no requieren atención médica: Manchas en los dientes / Molestias gástricas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original protegido del calor y fuera del alcance de los niños.
 No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

LABORATORIO CHILE S.A.
 Santiago - Chile
 www.laboratoriochile.cl

120-30-15888-01