

Levofloxacin

Comprimidos recubiertos 500 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Levofloxacin (como hemihidrato) 500 mg

Excipientes: Povidona, almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, poliacrilatos dispersión, talco, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N°6 lacado, colorante FD&C azul N°2 lacado, simeticona, macrogol, hipromelosa.

Indicaciones:

Tratamiento de las siguientes infecciones bacterianas sensibles al fármaco: Sinusitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica neumocócica adquirida en la comunidad, infecciones del tracto urinario (incluyendo pielonefritis e infecciones complicadas), infecciones de piel y tejido blandos.

Clasificación:

Antibacteriano.

Advertencias:

Use este medicamento sólo por indicación y supervisión médica. Durante o después del tratamiento con Levofloxacin, pueden presentarse síntomas de colitis pseudomembranosa (diarreas líquidas); en este caso se debe discontinuar inmediatamente el tratamiento y consultar a su médico. Se ha observado tendinitis con otros medicamentos de la misma familia, que puede llevar a ruptura de tendones del hombro, mano y al tendón de Aquiles. En pacientes con epilepsia puede desencadenar convulsiones. Debido a que Levofloxacin puede provocar fotosensibilización se recomienda a los pacientes que eviten la exposición innecesaria a la luz solar directa, o la exposición a rayos UV artificiales.

Contraindicaciones:

- No debe usarse en: pacientes con hipersensibilidad a Levofloxacin, a otro medicamento de la misma clase o a cualquiera de los excipientes de la fórmula.
- No usar durante el embarazo y lactancia.
- No administrar a niños o adolescentes menores de 18 años.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: sales de hierro y preparados que contengan zinc, magnesio o aluminio. Cuando se administra junto con teofilina o antiinflamatorios no esteroideos puede aumentar el riesgo de convulsiones.

No hay interacciones aparentes con los siguientes productos: carbonato de calcio, cimetidina, ciclosporina, digoxina, glibenclamida, probenecid, ranitidina, warfarina. Pacientes diabéticos tratados con hipoglucemiantes y con medicamentos de la misma clase que Levofloxacin pueden sufrir trastornos en la glicemia.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren de atención médica: náuseas, flatulencia, dispepsia, prurito, somnolencia.

Reacciones adversas:

Si usted presenta algunas de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico:

- **Reacciones adversas gastrointestinales:** Vómitos, diarrea, anorexia, dolor abdominal.
- **Dermatológicas:** Urticaria y enrojecimiento de la piel.

- **Neurológicas:** Dolor de cabeza, mareos y vértigo, insomnio, disminución o alteración de la sensibilidad, temblor, agitación, ansiedad, convulsiones y confusión.
- **Musculares y esqueléticas:** Dolor articular, dolor muscular, tendinitis. Alteración hepática y renal, alteraciones sanguíneas.
- **Otras reacciones:** Debilidad muscular, vaginitis por desarrollo de hongos y otros microorganismos resistentes.

Precauciones:

Se puede administrar, pero con precaución en los siguientes casos: pacientes con alteraciones del Sistema Nervioso Central como epilepsia y enfermedad cerebrovascular. En pacientes con historial de problemas a los tendones relacionados o no con la administración de este tipo de medicamentos. En pacientes con insuficiencia renal su dosis debe ser ajustada de acuerdo a lo indicado por su médico.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es 500 mg una vez al día, por 7 a 10 días.

Modo de empleo:

Tomar los comprimidos con un vaso de agua. Cumplir con todos los días el tratamiento prescrito por el médico.

Sobredosis:

- **Síntomas:** Se han descrito: confusión, mareos, deterioro de la conciencia y estados convulsivos, como también reacciones gastrointestinales tales como náuseas y erosión de la mucosa.
- **Tratamiento:** Se debe trasladar al paciente a un centro asistencial para instaurar el tratamiento sintomático con monitoreo de las funciones comprometidas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad a menos de 30°C. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.