

Carvedilol 12,5 mg

Comprimidos

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición:

Cada comprimido contiene: Carvedilol 12,5 mg

Excipientes: Lactosa monohidrato, almidón de maíz, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina.

Indicaciones:

Tratamiento de la hipertensión esencial. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva sintomática. Tratamiento de la angina estable.

Clasificación:

Antihipertensivo. Antianginoso.

Advertencias:

Use este medicamento sólo por indicación y bajo supervisión médica. Los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente y que requieran de anestesia general, deben comunicar al médico que están bajo tratamiento con carvedilol. En pacientes con diabetes mellitus se pueden enmascarar los síntomas característicos de un cuadro de hipoglicemia aguda como el aumento de la frecuencia cardiaca. Igualmente, puede enmascarar el aumento del ritmo cardiaco debido a la actividad excesiva de la glándula tiroides.

Contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes que hayan sufrido reacciones alérgicas con Carvedilol, o con problemas respiratorios como asma crónica, bronquitis obstructiva; personas con trastornos cardiológicos graves, pacientes con disminución severa de la frecuencia cardíaca y pacientes con enfermedad hepática grave.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Anestésicos administrados por inhalación: Eter etílico, Ciclopropano, Cloroformo, Metoxiflurano y Tricloroetileno. Con otros antihipertensivos. También Digoxina y Digitoxina, antidiabéticos orales e insulina. Rifampicina y Cimetidina pueden hacer variar la intensidad de su efecto y puede ser necesario un cambio en las dosis.

Efectos adversos:

Si usted presenta algunas de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, consulte a su médico: Alteraciones cardiocirculatorias: disminución de la frecuencia cardíaca, desmayo, dolor en el pecho, pérdida del equilibrio, (especialmente después de la primera dosis, en ancianos). Asma o dificultad respiratoria. Excepcionalmente, depresión mental, impotencia, ictericia (ojos amarillos, orina oscura), enfriamiento de extremidades, hinchazón y erupciones o manchas rojas en la piel. El uso de este medicamento puede producir otros efectos que normalmente no requieren de atención médica, a menos que perduren o se hagan molestos: hormigueo, dolor de cabeza y cansancio (más frecuentes al comienzo del tratamiento). También se han observado alteraciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.

Precauciones:

Pacientes con asma bronquial, enfermedades cardíaca o circulatoria, pueden presentar complicaciones de su enfermedad. En pacientes geriátricos se pueden provocar mareos o desmayos al ponerse de pie.

No suspenda el tratamiento sin antes consultarlo con su médico.

Embarazo: el médico debe evaluar los riesgos y beneficios para la madre y el feto.

Lactancia: su seguridad no ha sido establecida, por lo que el médico debe evaluar la conveniencia de su uso o la supresión de la lactancia.

Dosis:

El médico debe indicar la posología más apropiada para su caso particular; No obstante, las dosis usuales son: 6,25 mg dos veces al día ó 12, 5 mg una o dos veces en el día. Si no hay respuesta adecuada, la dosis puede aumentarse hasta 25 mg dos veces al día.

Modo de empleo:

Tomar los comprimidos con los alimentos, siempre a la misma hora.

Sobredosis:

Síntomas: pueden aparecer mareos o desmayo, enlentecimiento de los latidos del corazón y paro cardíaco. También podrían presentarse problemas respiratorios, asma, vómito, pérdida del conocimiento y ataque generalizado (convulsiones).

Tratamiento: Se debe colocar al paciente en posición acostada, para mejorar el flujo de sangre al cerebro y trasladarlo rápidamente a un centro asistencial para el tratamiento de los síntomas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener este producto lejos del alcance de los niños, en su envase original, a no más de 30°C, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.