




DISEÑO MATERIAL DE ENVASE

INSUMO : Inst. TOMISEPTIN 750 mg / 5 mL Jarabe (TIRO)	CODIGO/VERSION : D-ME-TILMAN017-01
DIMENSIONES : 135 x 210 mm	FECHA : 16 / JUN / 2022
COLOR PANTONE : Cuatricromía	ELABORADO POR : Franco Saavedra R.
MATERIAL : Papel	ESCALA : 1 : 1

EMPAQUE EXTERIOR: Cajas de cartón corrugado debidamente rotuladas y selladas



Tomi septin®

NOT36-002CL/01

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

TOMISEPTIN® JARABE 750 mg/5mL
(EXTRACTO LÍQUIDO DE HOJAS DESECADAS DE *THYMUS VULGARIS* L. (1:1))

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento ya que contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml de jarabe contiene:
EXTRACTO LÍQUIDO DE HOJAS DESECADAS DE *THYMUS VULGARIS* L. (1:1): 15,00 g (Equivalente a 20,25 - 24,75 mg de ácido rosmarínico)
Solvente de extracción: etanol 22% V/V
Excipientes: Sacarosa, glicerol, etanol, agua purificada.

¿QUÉ CONTIENE ESTE FOLLETO?

- ¿Qué es TOMISEPTIN® JARABE y en qué caso se utiliza?
- ¿Qué información debe conocer antes de tomar TOMISEPTIN® JARABE?
- ¿Cómo tomar TOMISEPTIN® JARABE?
- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
- ¿Cómo conservar TOMISEPTIN® JARABE?

1. ¿QUÉ ES TOMISEPTIN® JARABE Y EN QUÉ CASO SE UTILIZA?
TOMISEPTIN® es medicamento tradicional a base de plantas para tratar la tos productiva asociada al resfriado.
Este medicamento se indica en adultos y niños desde los 4 años de edad.

2. ¿QUE INFORMACIÓN DEBE CONOCER ANTES DE TOMAR TOMISEPTIN® JARABE?

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula o hipersensibilidad a la familia *Lamiaceae*, al polen de abedul o al apio.

Advertencias y Precauciones
Consultar a su médico o su químico farmacéutico antes de tomar TOMISEPTIN®.
Debe informar a su médico o a su químico farmacéutico en los siguientes casos:

- Si presenta signos de infección (fiebre, expectoraciones purulentas).
- Si tiene dificultades para respirar.

TOMISEPTIN® contiene sacarosa (azúcar) y alcohol.
Este medicamento contiene 8 g de sacarosa por dosis para adultos. Esto se debe tener en cuenta en pacientes diabéticos.
Este medicamento contiene 10,7% vol de etanol (alcohol), es decir hasta 1,27 g por dosis para adultos, lo que equivale a 32 mL de cerveza o 13 mL de vino. Peligroso si se usa en personas alcohólicas. Tener en cuenta en mujeres embarazadas, niños y grupos de alto riesgo como personas con enfermedad hepática o epilepsia.

Niños y adolescentes
TOMISEPTIN® no está indicado en niños menores de 4 años.

Interacciones
Antes de tomar este producto dígame a su médico si está tomando cualquier otro medicamento, incluyendo productos naturales o suplementos alimenticios. Es posible que no pueda tomar este producto, necesite una modificación en su dosis o un control especial si está tomando otros medicamentos.
Se debería evitar el uso simultáneo con otros medicamentos que contienen alcohol.

TOMISEPTIN® con alimentos y bebidas
No aplica.

CUTTING DIE PLAN & TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	Paper leaflet		
HxL (mm)	135 x 210 mm / Folded 35(-2)x135		
Support	50 g/m ²		
Supplier(s)	LGR Goldprint, Musch	Date	25/02/2022
LEGEND			
COLOURS	CMYK File, PANTONE on request		



DISEÑO MATERIAL DE ENVASE

INSUMO : Inst. TOMISEPTIN 750 mg / 5 mL Jarabe (RETIRO)	CODIGO/VERSION : D-ME-TILMAN017-01
DIMENSIONES : 135 x 210 mm	FECHA : 16 / JUN / 2022
COLOR PANTONE : Cuatricromía	ELABORADO POR : Franco Saavedra R.
MATERIAL : Papel	ESCALA : 1 : 1

EMPAQUE EXTERIOR: Cajas de cartón corrugado debidamente rotuladas y selladas

Embarazo

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Al no disponer de información suficiente para excluir cualquier efecto secundario durante el embarazo, no se aconseja el uso de este fármaco durante dicho período.

Conducción y uso de maquinas

No hay evidencia respecto al efecto en las habilidades para manejar vehículos o maquinaria.

3. ¿CÓMO TOMAR TOMISEPTIN® JARABE?

Asegúrese de tomar este medicamento siguiendo exactamente las instrucciones de este folleto o las indicaciones de su médico o químico farmacéutico. Consulte a su médico o químico farmacéutico en caso de dudas.

Las dosis recomendadas son las siguientes:

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 15 mL (1 cucharada), hasta 4 veces al día.

Niños a partir de 7 años: 10 mL (2 cucharaditas), hasta 4 veces al día.

Niños a partir de 4 años: 5 mL (1 cucharadita), hasta 4 veces al día.

Es importante respetar un intervalo de al menos 4 horas entre cada toma.

Tome TOMISEPTIN® preferiblemente después de las comidas.

Para una dosificación exacta, usar siempre la copa dosificadora que viene con el producto.

No tomar este medicamento por más de una semana sin indicación de su médico, si los síntomas persisten o en caso de aparición de fiebre.

Si tomó más TOMISEPTIN® de lo que debía

Contáctese inmediatamente con su médico o su químico farmacéutico.

En caso de sobredosis, se requiere un tratamiento sintomático.

Si olvidó tomar TOMISEPTIN®

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con TOMISEPTIN®

Los trastornos podrían eventualmente reaparecer.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pida más información a su médico o químico farmacéutico.

4. ¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

Este medicamento puede causar efectos secundarios, pero no ocurren sistemáticamente en todos los pacientes. Se observaron en pacientes algunas reacciones de hipersensibilidad, así como desordenes gástricos. No se conoce su frecuencia.

Reporte a su médico o químico farmacéutico cualquier otro efecto secundario que no esté reportado y que se presente durante el uso de este producto. Esto se aplica también a todo efecto indeseable que no se menciona en este folleto.

Al indicar los efectos indeseables, contribuye a proporcionar aún más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. ¿CÓMO CONSERVAR TOMISEPTIN® JARABE?

Mantenga este medicamento lejos del alcance de los niños.

No utilizar después de la fecha de vencimiento indicada en el empaque. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda, pregunte a su químico farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. Este medicamento no requiere ninguna condición especial de almacenamiento. Almacenar en su envase original.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

LABORATORIO CHILE S.A.
Santiago - Chile
www.laboratoriochile.cl



Tilman®



LABORATORIO CHILE