

Perebron Infantil

Jarabe 28mg/5ml

Composiciones y presentaciones:

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Oxolamina (como citrato) 28 mg

Excipientes: Ácido cítrico anhidro, sacarina sódica, metilparabeno, esencia de cerezas, colorante rojo FD&C N° 40, azúcar, agua purificada.

Clasificación:

Antiinflamatorio respiratorio.

Indicaciones:

Este medicamento está indicado en el tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación e irritación de las vías respiratorias.

Administración (oral):

Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- **Niños de 2 a 12 años:** 28 a 84 mg (5-15 mL) de jarabe pediátrico cada 4 horas.

- **Menores de 2 años:** 14 mg (2,5 mL) de jarabe pediátrico cada 4 horas.

Consejo de cómo administrarlo

Debe administrarlo utilizando el dosificador incluido en el envase. Luego de tomar el medicamento puede beber un vaso de agua.

Uso prolongado

No debe utilizar el medicamento por más de 8 días, si los síntomas persisten o empeoran, consulte nuevamente con su médico.

Precauciones:

Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

Lactantes y niños

No debe administrarlo a niños menores de 3 meses, a menos que su pediatra lo señale.

Precauciones especiales

No debe utilizar este medicamento en caso de presentar tos con producción de secreciones (flemas). Si su médico lo indica, este medicamento puede utilizarse en conjunto con antibióticos, para mejorar el tratamiento antiinfeccioso.

Precaución en diabéticos: Contiene azúcar.

Contraindicaciones:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Interacciones:**Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, acenocumarol.

Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento si padece problemas de coagulación sanguínea.

Efectos adversos:

Pueden presentarse algunos efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: somnolencia, sensación de fatiga muscular, sedación, alucinaciones, agitación, sequedad de boca, palpitaciones.

Sobredosis:

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.