

## **Piroxicam Comprimidos**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

### **Composición y presentación:**

Cada comprimido contiene: Piroxicam 20,00 mg  
Excipientes: Celulosa microcristalina, sodio almidón glicolato, lauril sulfato de sodio, magnesio estearato, lactosa, colorante FD&C rojo N° 40.

### **Clasificación:**

Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético.

### **¿Para qué se usa?:**

Este medicamento está indicado en el tratamiento de estados inflamatorios y dolorosos agudos.

### **Administración (oral):**

- Rango y frecuencia: El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 10 a 40 mg al día, según la indicación del médico.
- Consejo de cómo administrarlo: Debe tomarlo en conjunto alimentos o antiácidos para evitar irritación estomacal.
- Uso prolongado: Le puede causar problemas estomacales (Úlceras), inflamación del hígado, problemas a los riñones y hemorragias. Por lo que debe realizar visitas periódicas a su médico.

### **Precauciones:**

- Usted debe consultar a su médico antes de usar piroxicam, si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca)
- Mayores de 60 años: Los problemas estomacales pueden ser severos en pacientes mayores de 60 años.
  - Consumo de alcohol: Si Ud. toma alcohol junto al medicamento, puede aumentar el riesgo de problemas estomacales y hemorragias.
  - Manejo de vehículos: Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.
  - Embarazo: Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.
  - Lactancia: Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños: Puede utilizarlo sólo si está indicado por su pediatra y bajo circunstancias específicas.
- Precauciones especiales: Este tipo de medicamentos interfiere en la coagulación de la sangre, por lo que debe dejar de tomarlo por lo menos tres días antes de someterse algún tipo de cirugía.  
Evite el consumo de otro antiinflamatorio, mientras esté en tratamiento con piroxicam.  
Informe a su médico si está en tratamiento con anticoagulantes, medicamentos para la diabetes o diuréticos.  
Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o Úlceras estomacales.

### **Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

- Si padece de Úlcera gastroduodenal.
- Si ha presentado síntomas de alergia al piroxicam o a medicamentos similares como el ácido acetilsalicílico (aspirina).
- Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.
- Estando embarazada o durante el período de lactancia.
- No debe usar este medicamento en el período inmediato a un by pass coronario

### **Interacciones:**

- Medicamentos: Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: medicamentos para la presión, prednisona, warfarina, antibióticos en general, Itraconazol o Ketoconazol, Penicilamina, Acido Valpróico, Fenitoína, Ciclosporina, Digoxina o Digitoxina, Litio, Metotrexato, Probenecid, Triamtereno o Zidovudina (AZT). No se debe tomar en forma conjunta con otros medicamentos como ácido acetilsalicílico (aspirina) (o similares) a menos que su médico indique lo contrario.
- Enfermedades: Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de hemorragias, inflamación o Úlceras gastroduodenales, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, anemia, asma, epilepsia, enfermedad de Parkinson, cálculos renales, o antecedentes de enfermedades al corazón, alcoholismo, enfermedades renales o al hígado.

### **Efectos adversos:**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, con o sin adormecimiento de las piernas, dolor en el pecho, Úlcera péptica con vómitos con sangre, melena, disminución en la cantidad de orina o en la frecuencia para orinar.

Otros efectos:

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al

medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, diarrea leve, constipación leve, dolor de cabeza leve, vértigo, somnolencia, Úlceras o dolor en la boca, inusuales temblores o entumecimiento de las manos o los pies, visión azul rojiza; las cuales tienden a desaparecer con el tiempo, pero si continúan o empeoran, consulte con su médico.

**Sobredosis:**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo, confusión y malestar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños, protegido del calor y humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.