

**Red-Off**  
**Nafazolina clorhidrato**  
**Solucion oftálmica 0,0125%**

**Composición y presentación:**

Cada 1 mL de solución oftálmica contiene:

Nafazolina clorhidrato 0,125 mg

Excipientes: Cloruro de benzalconio, edetato disódico, ácido bórico, borato de sodio, agua purificada.

Envase: Frasco gotario de 15 mL.

**Recomendaciones de uso:**

Irritación y congestión ocular (ojo rojo).

**Precauciones y advertencias:**

- En caso de sufrir alguna enfermedad de tipo crónico, consulte con el farmacéutico antes de usar Red Off.
- Administrar con precaución en mujeres embarazadas y durante el período de lactancia.
- Existe la posibilidad que una cierta cantidad de nafazolina se absorba y pase a la circulación general dando lugar a reacciones adversas. Suspender el tratamiento y consultar al médico si se produce dolor ocular o cambios en la visión, o si la irritación continúa, empeora o persiste más de 72 horas.
- No usar en caso de padecer glaucoma de ángulo cerrado o de haber presentado reacción alérgica a la Nafazolina u otro componente de la formulación.
- No usar en niños menores de 2 años.

**Interacciones y presencia de otras enfermedades:**

Si padece alguna enfermedad crónica (hipertensión, diabetes o glaucoma) o si Ud. está tomando otros medicamentos consulte con el farmacéutico o su médico antes de aplicarse las gotas; se pueden esperar interacciones medicamentosas con algunos antidepresivos. Se recomienda administrar con precaución en personas que sufren de enfermedad cardiovascular, porque se pueden producir alteraciones cardíacas o hipertensión; en diabéticos, se puede producir una mínima hiperglicemia.

**Efectos adversos:**

El uso de los medicamentos puede producir algunos efectos no deseados los que pueden llegar a ser serios. Si el uso de Red-Off le provoca aumento de la irritación ocular, visión borrosa, dilatación de las pupilas, aumento de la presión intraocular, suspenda la aplicación y consulte con el médico.

**Modo de empleo y dosis:**

Aplicar en cada ojo, 1 o 2 gotas dos a tres veces al día.

El tratamiento no debe continuar por más de 72 horas, sin indicación del médico.

No utilizar si la solución está turbia, precipitada o ha cambiado de color.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y fuera del alcance de los niños.  
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No recomiende este medicamento a otra persona.

120217-D-ME-IVAXH003-02