

Folleto de informacion alpaciente suprim comprimidos 25 mg (anfepramona clorhidrato)

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Composición

Cada comprimido contiene:

Anfepramona Clorhidrato 25 mg.

Excipientes: Almidón de maíz pregelatinizado, Lactosa monohidrato, Celulosa microcristalina, Ácido tartárico, Celulosa microcristalina silicificada, Talco, Estearato de magnesio.

¿Qué es SUPRIM y para que se utiliza?

Suprim (Anfepramona Clorhidrato) es un estimulante similar a anfetamina. Suprim es un supresor del apetito que afecta el sistema nervioso central.

Suprim se usa junto a la dieta y ejercicios para el tratamiento de la obesidad en las personas que tienen un índice de masa corporal (IMC) de al menos 30 kilogramos por metro cuadrado.

Suprim por lo general se administra después de que la dieta y el ejercicio no han tenido éxito en la disminución de peso.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Suprim?

Usted no debe tomar Suprim si está en estado de agitación, o si tiene hipertensión pulmonar, enfermedad severa de las arterias coronarias, glándula tiroidea hiperactiva, glaucoma, presión arterial gravemente alta, o un historial de abuso a droga.

No use este medicamento si usted ha usado un inhibidor de la MAO en los últimos 14 días, como isocarboxacida, linezolid, azul de metileno, fenelzina, rasagilina, selegilina, o tranilcipromina.

No tome Suprim junto con otros medicamentos para disminuir de peso a menos que su médico lo indique.

¿Qué debería consultar con su médico antes de tomar Suprim?

No use Suprim si usted ha usado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días. Puede ocurrir una interacción peligrosa con este tipo de medicamentos. Los inhibidores de la

MAO incluyen isocarboxácida, linezolid, azul de metileno, fenelzina, rasagilina, selegilina, tranilcipromina, y otros.

Usted no debe usar Suprim (Anfepramona) si es alérgico a éste medicamento, o si tiene:

- Hipertensión pulmonar arterial.
- enfermedad severa de las arterias coronarias; presión arterial gravemente alta;
- Hipertiroidismo
- un historial de abuso a las drogas;
- Glaucoma; o si está en un estado agitado.

No tome Suprim con cualquier otro medicamento indicado para bajar de peso a menos que su médico le haya indicado hacerlo. Tomar Suprim en combinación con otros medicamentos para bajar de peso o supresores del apetito puede causar un trastorno fatal raro de los pulmones llamado hipertensión pulmonar.

Para asegurarse que Suprim es seguro para usted, dígame a su médico si alguna vez ha tenido:

- enfermedad del riñón;
- presión arterial alta;
- un trastorno de las válvulas cardíacas o del ritmo cardíaco;
- Convulsiones o epilepsia; o si ha tomado otros medicamentos para bajar de peso durante los últimos 12 meses.

No se conoce si este medicamento causará daño al bebé nonato. Si usted usa Suprim durante su embarazo, su bebé puede volverse dependiente del medicamento. Esto puede causar síntomas de abstinencia en el bebé después de su nacimiento. Dígame a su médico si usted está embarazada o planea quedar embarazada.

Suprim puede pasar a la leche materna y puede afectar al bebé lactante. Dígame a su médico si está dando de amamantar. Suprim no está aprobado para usarse en menores de 16 años de edad.

Cómo debo tomar Suprim (Anfepramona)?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción. Tal vez su médico en ocasiones cambie su dosis. No use esta medicina en cantidades mayores o menores, o por más tiempo de lo recomendado. Suprim puede crear hábito.

Nunca comparta Suprim con otra persona, especialmente con alguien con historial de abuso de drogas o adicción.

Mantenga el medicamento en un lugar donde otros no lo puedan encontrar. Vender o regalar este medicamento es ilegal.

El comprimido de Suprim por lo general se toma tres veces al día antes de comidas.

Dígale a su médico si usted no pierde por lo menos 2 Kg después de tomar el medicamento por 4 semanas junto con una dieta baja en calorías.

Si necesita cirugía, dígame al cirujano por adelantado que usted está usando Suprim. Quizás necesite dejar de usar el medicamento por un breve tiempo.

No deje de usar Suprim de forma repentina, después de usarla por mucho tiempo, o podría tener síntomas desagradables de abstinencia. Pregúntele a su médico como dejar de tomar Suprim de forma segura.

Guarde a temperatura ambiente fuera de la humedad y del calor.

Mantenga un registro de su medicina. Suprim es una droga de abuso y usted debería saber si alguien está usando su medicina inapropiadamente o sin prescripción

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Tome la dosis que dejó de tomar tan pronto se acuerde. Sátese la dosis que dejó de tomar si ya casi es hora para la siguiente. No tome más medicamento para alcanzar la dosis que dejó de tomar.

¿Qué sucedería en una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia o llame al CITUC número +56 2 2 635 3800

Los síntomas de sobredosis pueden incluir inquietud, temblores, reflejos hiperactivos, respiración rápida, confusión, alucinaciones, pupilas dilatadas, pánico, agresividad, o convulsiones.

¿Qué debo evitar mientras tomo Suprim?

Este medicamento puede perjudicar sus pensamientos o reacciones. Tenga cuidado si usted conduce un vehículo o tiene que hacer algo que demande que se mantenga alerta. Tomar alcohol con este medicamento puede causar efectos secundarios.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de Suprim?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene síntomas de una reacción alérgica: ronchas; dificultad para respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

Llame a su médico de inmediato si usted tiene:

- dolor de pecho, sensación de que le falta aire al respirar (especialmente con actividad);
- hinchazón en sus tobillos o pies;
- ansiedad, sentirse nervioso o tembloroso;
- espasmos musculares;
- sensación de felicidad o tristeza extrema;
- palpitaciones cardíacas rápidas o fuertes, aleteo en su pecho; o sensación de desvanecimiento, como que se va a desmayar.

Efectos secundarios comunes pueden incluir:

- náusea, vómito, diarrea, malestar estomacal, estreñimiento;
- dolor de cabeza, visión borrosa;
- problemas para dormir (insomnio);
- mareo, somnolencia, sensación de cansancio;
- sentirse deprimido;
- boca seca, sabor desagradable en su boca;
- Disminución del deseo sexual; o enrojecimiento, moretones, o sarpullido.

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para consejos médicos relacionados a efectos secundarios.

¿Qué otros medicamentos afectarán a Suprim?

- Dígale a su médico todos los medicamentos que usa, y cualquiera que comience o deje de usar, especialmente: insulina o medicamentos orales para el el - - - tratamiento de diabetes;
- medicamentos para la presión arterial;
- o medicamentos para el tratamiento de enfermedades mentales.

Esta lista no está completa. Otros medicamentos pueden interactuar con Suprim, incluyendo medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. No todas las interacciones posibles aparecen en esta guía del medicamento.

¿Dónde puedo obtener más información?

Su farmacéutico le puede dar más información acerca de Suprim.

Recuerde, mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicamentos con otros, y use este medicamento sólo para la condición por la que fue recetada.