

## **Terbinafina**

### **Comprimidos 250 mg**

#### **Composición y presentación:**

Cada comprimido contiene:

Terbinafina Clorhidrato 250 mg

Excipientes: Hidroxipropilcelulosa, dióxido silícico coloidal, almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, celulosa microcristalina.

#### **Indicaciones:**

Terbinafina es un antimicótico. Se usa por vía oral en infecciones de la piel, del cuero cabelludo y de las uñas provocadas por hongos (dermatofitos) tales como: tiña del cuerpo, tiña del pie (pie de atleta), tiña de la cabeza (del cuero cabelludo), tiña cruris (ingle).

Infecciones de las uñas (onicomicosis) de las manos y de los pies provocadas por hongos.

Infecciones extensas por levaduras (Cándida albicans) moniliasis o candidiasis.

#### **Clasificación:**

Antimicótico.

#### **Precauciones y advertencias:**

Antes de tomar este medicamento, Ud. debe tener presente que:

- Úselo sólo por indicación y con controles médicos periódicos.
- Los pacientes con enfermedad hepática crónica preexistente deben recibir la mitad de la dosis oral normal. Si se presentan síntomas o signos tales como náuseas persistentes, pérdida del apetito, cansancio, ictericia, oscurecimiento de la orina y deposiciones de aspecto pálido se debe informar inmediatamente al médico para descartar el posible origen hepático de ellos; pacientes con alteración de la función renal también deben recibir una dosis menor que la normal.
- Las personas que son bebedores excesivos están mas expuestos a sufrir efectos adversos.
- **Alergias:** Informe al médico si ha sufrido anteriormente alguna reacción causada por terbinafina o si es alérgico a otros medicamentos o alimentos. Los pacientes sensibles a la forma tópica (crema) de terbinafina pueden serlo también a la forma oral.
- **Embarazo y lactancia:** No se recomienda administrar durante el embarazo a menos que el médico estime que los beneficios sean superiores a los riesgos potenciales. La terbinafina se elimina en la leche materna después de la administración oral.
- **Niños:** No se dispone de información sobre la relación existente entre la edad y los efectos de la terbinafina en los pacientes pediátricos. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia en niños menores de 12 años.

#### **Contraindicaciones:**

No usar en personas con antecedentes de alergia o de hipersensibilidad a la terbinafina o a cualquiera de los componentes.

Personas que padecen de alteraciones graves de hígado o riñón.

#### **Interacciones con otros medicamentos:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos:

- **Cimetidina:** Aumenta la concentración sanguínea de terbinafina (puede ser necesario modificar las dosis).
- **Anticonceptivos orales:** Posibles trastornos menstruales.
- **Rifampicina:** Disminuye la concentración sanguínea.

### **Efectos indeseables:**

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos pasajeros que no requieren atención médica, a menos que se mantengan o se hagan muy molestos: Los más comunes son síntomas gastrointestinales (sensación de plenitud gástrica, pérdida del apetito, dispepsia, náuseas,); Alteraciones del gusto o pérdida de él, caída del cabello. Aumento de peso.

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en este folleto consulte a su médico.

Dolor abdominal, diarrea, mareos, desmayo, reacciones cutáneas leves (rash, urticaria); dolores de las articulaciones (artralgia, mialgia).

- **Reacciones de mayor cuidado:** Trastornos hepáticos, ictericia, (coloración amarilla de piel y ojos, orina oscura, deposiciones pálidas, dolor abdominal ) se han descrito durante el tratamiento con Terbinafina. Alteraciones sanguíneas, que se manifiestan por cansancio, fiebre, irritación de la garganta, escalofríos, pequeñas hemorragias. Reacciones dérmicas importantes como inflamación grave y extensa de la piel.

### **Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es 250 mg (un comprimido) una vez al día.

### **Modo de empleo:**

Los comprimidos pueden tomarse con un vaso de agua o bien con los alimentos. La duración del tratamiento varía según el tipo y la severidad de la infección. Duración probable de los tratamientos:

- **Tiña del pie o pie de atleta (interdigital o plantar):** 2 a 6 semanas.

- **Candidiasis cutánea:** 2 a 4 semanas.

- **Tiña de la cabeza (tinea capitis):** 4 semanas.

- **Infecciones de las uñas:** En la mayoría de los pacientes la duración de un tratamiento exitoso es de 6 semanas para las uñas de las manos y de 12 semanas para las de los pies.

### **Sobredosis:**

Los síntomas informados en caso de sobredosis accidental (hasta 5g) han sido cefaleas, náuseas, dolor epigástrico y mareos. El tratamiento recomendado de la sobredosis consiste en la eliminación del medicamento principalmente por administración de carbón activado; trasladar al afectado a un centro de urgencia para instaurar el tratamiento adecuado.

### **Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.