

Trittico 100 mg

Trazodona Clorhidrato

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Trazodona clorhidrato 100 mg

Excipientes: Lactosa, calcio fosfato, almidón de maíz, polividona, almidón glicolato de sodio, magnesio estearato, celulosa microcristalina, alcohol polivinílico, titanio dióxido, macrogol 3000, talco.

Indicaciones:

Tratamiento de los episodios depresivos mayores con o sin ansiedad manifiesta.

Clasificación:

Antidepresivo.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Pueden requerirse hasta 4 semanas para que los resultados terapéuticos sean significativos, aunque la gran mayoría de los pacientes notan la mejoría en 2 semanas.

Advertencia especial:

Este medicamento no debe administrarse a menores de 18 años de edad. Se ha visto que el uso de antidepresivos en niños y adolescentes aumenta el riesgo de pensamientos y conductas suicidas.

Contraindicaciones:

No usar en personas con hipersensibilidad a la droga. No asociar a inhibidores de la monoaminoxidasa (I-MAO).

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Depresores del sistema nervioso central, antidepresivos tricíclicos, haloperidol, alcohol, antihipertensivos, anticolinérgicos, antihistamínicos, digoxina.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: sabor desagradable, mareos, somnolencia, sequedad de boca, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico: Sobre el sistema nervioso central: confusión y temblores musculares. Reacción alérgica, latidos cardíacos rápidos o lentos, hipotensión, desmayos, priapismo (erección prolongada, dolorosa e inapropiada del pene), excitación no habitual. Pérdida de la coordinación muscular.

Precauciones:

Consultar al médico antes de suspender el tratamiento, puede ser necesario reducir gradualmente la dosis. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y de otros depresores del SNC durante el tratamiento. Puede producir somnolencia, tener precaución al conducir vehículos o realizar tareas que requieran atención. Puede producir mareos, tener precaución al levantarse bruscamente

desde una posición en reposo, puede producir sequedad en la boca, para aliviarla usar caramelos o chicles sin azúcar. En los pacientes geriátricos es más probable que se produzca sedación. Este producto contiene lactosa monohidrato, precaución en pacientes diabéticos.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular; no obstante, la dosis usual recomendada es:

- Adultos: Inicialmente 50 mg tres veces al día, aumentando la dosis en otros 50 mg al día cada tres o cuatro días, según necesidades y tolerancia, hasta 400 mg diarios.

Prescripción usual límite para adultos:

- Pacientes ambulatorios: hasta 400 mg diarios.
- Pacientes hospitalizados: hasta 600 mg diarios.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral. En lo posible tomar este medicamento con alimentos o poco después de las comidas o de un refrigerio para reducir al mínimo las molestias gástricas y el riesgo de mareos o aturdimiento. Cumplir estrictamente el tratamiento. Si por olvido omite una dosis, tomarla lo antes posible. No duplicar dosis.

Sobredosis:

No existe antídoto específico. En caso de sobredosis accidental, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia, para un tratamiento sintomático y de mantención (llevar este folleto informativo).

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños, protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.