

Troxzil®
Tinidazol
Comprimidos recubiertos 1 g

Composición y presentación:

Cada comprimido recubierto contiene:

Tinidazol 1g

Excipientes: Povidona, croscarmelosa sódica, ácido esteárico, lauril sulfato de sodio, lactosa monohidrato, polímero catiónico de dimetil-aminoetil metacrilato, talco, estearato de magnesio, dióxido de titanio, macrogol, agua purificada.

Indicaciones:

Infecciones urogenitales del hombre y la mujer causadas por tricomonas. Se utiliza en giardiasis, amebiasis intestinal y extra intestinal (hepatitis y absceso hepático amebiano). Profilaxis de infecciones postoperatorias por protozoos y bacterias anaeróbicas sensibles.

Clasificación:

Antiprotozoario.

Advertencias:

Úsele sólo por indicación y bajo supervisión médica.. No consumir alcohol durante el tratamiento

Contraindicaciones:

Alteraciones sanguíneas, enfermedades activas del SNC, pacientes con trastornos neurológicos. Primer trimestre del embarazo. Hipersensibilidad a los medicamentos relacionados (imidazólicos). Lactancia.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se ha descrito interacción con: Alcohol (Efecto antabus), disulfiram, anticoagulantes orales.

Reacciones adversas:

El uso de este medicamento puede producir efectos indeseables que normalmente no requieren atención médica: Sabor desagradable, pérdida del apetito, dolor de cabeza y oscurecimiento de la orina.

Si se presentan reacciones adversas de cuidado mientras esté en tratamiento con este producto, consulte a su médico: Neuropatía periférica (entumecimiento, hormigueo, dolor o debilidad en manos o pies. Crisis convulsivas. Toxicidad del SNC (torpeza o inestabilidad, cambios en el estado de ánimo o mental). Reacciones de hipersensibilidad (enrojecimiento de la piel, picazón), leucopenia (dolor de garganta, ronquera y fiebre), pancreatitis (dolor intenso en el abdomen y espalda), candidiasis vaginal.

Precauciones:

Evitar el uso en pacientes con alteraciones en la composición de la sangre o con enfermedades neurológicas activas. No consumir alcohol. Este producto contiene tartrazina, precaución en pacientes alérgicos a este colorante.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante las dosis usuales recomendadas son:

- **Adultos:** 1 a 2 comprimidos tomados como dosis única. En amebiasis, el tratamiento debe durar 3 días:

- **Niños:** 50 – 60 mg/kg de peso corporal.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral y tomar con un vaso de agua. Cumplir el ciclo completo del tratamiento indicado por su médico.

Sobredosis:

La sobredosis se caracteriza por aparición de leucopenia, (disminución de la cantidad de los glóbulos blancos en la sangre) y exacerbación de las reacciones adversas. En caso de sobredosis accidental, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial para el tratamiento de los síntomas y el control de las funciones comprometidas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, protegido del calor y la humedad, a no más de 30°C y fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.